

# Örebro Auswertung

Die Kurzversion des ÖMPSQ beinhaltet 10 Fragen aus der Vollversion (Linton, Nicholas & MacDonald, 2011).

Die jeweiligen Fragen können von 0-10 bewertet werden. 0 bedeutet keine Einschränkung/Zustimmung, 10 bedeutet starke Einschränkungen/stärkste Zustimmung. Bei drei Fragen ist diese Bewertung umgedreht (Fragen 3, 4 und 8).

Insgesamt kann ein Höchstwert von 100 Punkten erreicht werden. Ein Wert >50 deutet auf ein höheres Risiko auf zukünftige Einschränkungen hin.

Linton, S. J., Nicholas, M., MacDonald, S. (2011). Development of a Short Form of the Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire. *Spine*, 36,1891–1895.doi: 10.1097/BRS.0b013e3181f8f775

Law RK, Lee EW, Law SW, Chan BK, Chen PP, Szeto GP. The predictive validity of OMPQ on the rehabilitation outcomes for patients with acute and subacute non-specific LBP in a Chinese population. *J Occup Rehabil*. 2013 Sep;23(3):361-70. doi: 10.1007/s10926-012-9404-y.

Dagfinrud H, Storheim K, Magnussen LH, Ødegaard T, Hoftaniska I, Larsen LG, Ringstad PO, Hatlebrekke F, Grotle M. The predictive validity of the Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire and the clinicians' prognostic assessment following manual therapy treatment of patients with LBP and neck pain. *Man Ther*. 2013 Apr;18(2):124-9. doi: 10.1016/j.math.2012.08.002. Epub 2012 Sep 25.

Gabel CP, Melloh M, Yelland M, Burkett B, Roiko A. Predictive ability of a modified Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire in an acute/subacute low back pain working population. *Eur Spine J*. 2011 Mar;20(3):449-57. doi: 10.1007/s00586-010-1509-4. Epub 2010 Jul 15.

Cuesta-Vargas AI, González-Sánchez M. Spanish version of the screening Örebro musculoskeletal pain questionnaire: a cross-cultural adaptation and validation. *Health Qual Life Outcomes*. 2014 Oct 29;12:157. doi: 10.1186/s12955-014-0157-5.